



Data:	29/10/2008
Referència:	2008088
	CB

NOTA INFORMATIVA

Anul·lació de l'autorització de comercialització de les presentacions en forma de comprimits recoberts del medicament REMINYL (galantamina)

Tipus d'alerta: **Desproveïment** Tipus de producte: **Medicament**
Destinataris:

* Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears * Entitats proveïdores d'atenció primària *
Col·legis de farmacèutics * Col·legis de metges * Dipòsits de medicaments extrahospitalaris * Dipòsits de
medicaments intrahospitalaris * Gerència d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries (CatSalut)
* Regions sanitàries (CatSalut) * Sanitat Respon * CedimCat * Serveis territorials del Dept. de Salut *
Serveis de farmàcia hospitalària * Subd. Gral. Avaluació i Inspecció Sanitària del Dept. Salut *

El laboratori Janssen Cilag, SA ha informat que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha autoritzat l'anul·lació l'autorització de comercialització de les presentacions del medicament REMINYL (galantamina) en forma de comprimits recoberts:

- Reminyl 4 mg comprimits recoberts, 14 comprimits CN:917856.
- Reminyl 4 mg comprimits recoberts, 56 comprimits CN:780163.
- Reminyl 8 mg comprimits recoberts, 56 comprimits CN:917864.
- Reminyl 12 mg coprimits recoberts, 56 comprimits CN:918920.

A partir de l'1 de novembre, en el mercat només estaran disponibles les presentacions de REMINYL en forma de lliberació prolongada de 8 mg, 16 mg i 24 mg.

Per a una correcta administració de la posologia dels pacients que actualment s'estaven tractant amb REMINYL en forma de comprimits recoberts i continuïn el tractament amb REMINYL en forma de càpsules de lliberació prolongada cal tenir en compte que:

- Els pacients que es tractaven amb dos comprimits recoberts de 4 mg en dues preses al dia, s'hauran de pendre una única càpsula de lliberació prolongada de 8 mg al dia.
- Els pacients que es tractaven amb dos comprimits recoberts de 8 mg en dues preses, s'hauran de pendre una única càpsula de lliberació prolongada de 16 mg al dia.
- Els pacients que es tractaven amb dos comprimits recoberts de 12 mg en dues preses, s'hauran de pendre una única càpsula de lliberació prolongada de 24 mg al dia.

Us enviem aquesta informació per tal que en tingueu coneixença i pugueu fer-ne la difusió escaient dins el vostre àmbit competencial.

Salvador Cassany Pou
Cap de servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris