



MINISTERIO
DE SANIDAD
Y CONSUMO

GABINETE TELEGRAFICO

FAX

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO	
GABINETE TELEGRAFICO	
18 ENE. 2007	
Nº PAG	2
Nº FAX	1142

**REMITENTE: S.G. DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS**

Nº FAX: 915964407

DESTINATARIO:

**SERVICIO CATALAN DE SALUD
DIVISION DE ATENCION FARMACEUTICA Y
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**

Nº FAX: 93/4038915

Fecha de envio: 18/1/07


TEXTO: Se adjunta información sobre la inclusión en la prestación farmacéutica de una nueva indicación para los siguientes medicamentos :

656355 ISCOVER 75 mg - 28 comprimidos con cubierta pelicular

656553 PLAVIX 75 mg - 28 comprimidos con cubierta pelicular

Nº de Páginas excluida la portada: 1

En caso de no recibir todas las páginas, rogamos llamen al Telf: 91/5961556





MINISTERIO
DE SANIDAD
Y CONSUMO

SECRETARÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE FARMACIA Y
PRODUCTOS SANITARIOS
S. G. DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS
Y PRODUCTOS SANITARIOS

SERVICIO CATALAN DE SALUD
DIVISION DE ATENCION FARMACEUTICA Y PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
Travessera de las Corts, 131-159
08028-BARCELONA

Les informamos, que se ha incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud una nueva indicación para los siguientes medicamentos:

- Calificados de Cupón Precinto Diferenciado

GRUPO TERAPEUTICO	B01AC04
NOMBRE Y PRESENTACION	CN-656355 ISCOVER 75 mg – 28 comprimidos con cubierta pelicular CN-656553 PLAVIX 75 mg – 28 comprimidos con cubierta pelicular
PRINCIPIO ACTIVO	Clopidogrel hidrogenosulfato
FECHA DE INCLUSION EN LA PRESTACION FARMACEUTICA AL SNS	15 de enero de 2007
NUEVA INDICACION	Clopidogrel está indicado en la prevención de eventos aterotrombóticos en: Pacientes que han sufrido infarto de miocardio (desde los pocos días hasta un máximo de 35 días), infarto cerebral (desde los 7 días hasta un máximo de 6 meses) o arteriopatía periférica establecida. Pacientes que presentan síndrome coronario agudo: - síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST (angina inestable o infarto de miocardio sin onda-Q), en combinación con ácido acetilsalicílico (AAS). - infarto de miocardio agudo con elevación del segmento ST, en combinación con AAS en pacientes tratados médicamente de elección para terapia trombolítica. (NUEVA INDICACIÓN)

Madrid, 17 de enero de 2007

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS
Y PRODUCTOS SANITARIOS

Pedro Gómez Pajuelo